

MONKEY

DUST



**ENERGY
CONTROL**

\\ QUÉ ES

Monkey Dust es un término que engloba varias catinonas sintéticas del grupo de las **pirrolidinas**, de uso generalmente fumado. Incluye sustancias como la MDPV o la MDPHP, caracterizadas por su elevada potencia estimulante a **dosis muy bajas**.

Sus dosis, efectos y riesgos pueden variar en función de la sustancia, por lo que es importante extremar la precaución si se decide consumir.

El análisis de *Monkey Dust* es fundamental para conocer su verdadera composición.

\\ VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Las vías más habituales son la oral (la más segura), esnifada y vaporizada/inhalada. También se ha descrito el uso inyectado de algunas de estas sustancias.

Las vías inhalada e inyectada, por su rápido inicio de efectos, pueden propiciar la redosificación y aumentar los riesgos.

\\ DOSIFICACIÓN

Algunas sustancias vendidas como *Monkey Dust* producen efectos a **dosis muy bajas**: desde 1 mg o incluso inferiores.

Esto hace que **su dosificación sea muy complicada**, por lo que es imprescindible usar una báscula de alta sensibilidad (0,0001 g).

No existe una dosis estándar: la potencia y los efectos varían según la sustancia que contenga la muestra de *Monkey Dust*, persona y vía de administración. Si decides consumir, empieza siempre con dosis prudencialmente bajas y extrema las precauciones si la muestra no está analizada, proviene de un nuevo lote o de una persona desconocida.

		UMBRAL	MEDIA	ALTA
ORAL				
	MDPV	1 mg	3-8 mg	>8 mg
	MDPHP	5 mg	20-40 mg	>60 mg
VAPORIZADA				
	MDPV	< 1 mg	2-4 mg	>4 mg
	MDPHP	2 mg	10-25 mg	>25 mg

\\ EFECTOS

- ★ Estimulación y euforia intensas.
- ★ Aumento de la energía.
- ★ Sociabilidad y desinhibición.
- ★ Aumento de la libido.
- ★ Supresión del apetito.

\\ EFECTOS ADVERSOS

Los riesgos asociados se deben a su larga duración, su elevada potencia y su facilidad de producir un **consumo compulsivo**. Estos incluyen:

- ★ Ansiedad, paranoia, episodios psicóticos.
- ★ Aumento de la temperatura corporal.
- ★ Hipertensión, taquicardia.
- ★ Insomnio prolongado.
- ★ Daños asociados a la vía inyectada (heridas e infecciones).

Presta atención a la acumulación de estimulación y falta de sueño, ya que pueden aumentar el riesgo de síntomas psicóticos.




SEÑALES DE ALERTA

- ★ Desconfianza intensa.
- ★ Sensación de que otras personas te observan, interpretar situaciones neutras como amenazas.
- ★ Percibir cosas que otras personas no perciben o dificultad para cuestionar estas percepciones.

\\ MEZCLAS E INTERACCIONES

- ★ Con **estimulantes** como metanfetamina: aumenta el riesgo de psicosis, insomnio prolongado, hipertensión y sobreestimulación (taquicardia, temblores, sudoración excesiva, tensión muscular, ansiedad, paranoia, confusión mental, agitación)
- ★ Su mezcla con **Tramadol o Bupropión**, puede aumentar el riesgo de convulsiones.
- ★ Con **antirretrovirales (ARV)**: el *Monkey Dust* puede interferir con el metabolismo del hígado y reducir la efectividad del tratamiento ARV, así como incrementar la toxicidad de ambas sustancias.

- 
- ★ Con **depresores** como alcohol o GHB: se enmascaran los efectos, aumentando el riesgo de sobredosis al intentar compensar-compensarlos. También aumenta el riesgo de convulsiones.

\\ **RECOMENDACIONES Y REDUCCIÓN DE RIESGOS**

- ☐ La MDPV y MDPHP no son la misma sustancia, se dosifican diferente y no tienen los mismos riesgos. **Analiza siempre que puedas** y ajusta la dosis en función del resultado.
 - ☐ La vía vaporizada se asocia a consumos más compulsivos. Procura marcarte límites de consumo antes de empezar.
 - ☐ En entornos sexualizados, el consumo puede aumentar el rendimiento sexual, pero los efectos residuales pueden prolongarse incluso cuando este efecto ya ha disminuido.
 - ☐ **Existe poca información** sobre el *Monkey Dust* y los riesgos asociados a su consumo. Si encuentras sus efectos más potentes de lo esperado, es aconsejable explorar otras sustancias más fáciles de dosificar.
- 

La información sobre los efectos y riesgos de la *Monkey Dust* en personas es aún limitada. Este material se basa en la evidencia científica disponible y en fuentes especializadas de reducción de riesgos, incluyendo TripSit y PsychonautWiki. Parte de esta información procede de experiencias de personas usuarias y debe interpretarse con cautela.

Si necesitas resolver dudas escríbenos
para recibir información y asesoramiento
gratuito libre de juicios



687 633 694

*Información práctica dirigida a personas que consumen
drogas en el momento del consumo.*

*La única manera de no asumir riesgos al consumir drogas
es no hacerlo. Si decides consumirlas, conoce los riesgos y
cómo reducirlos.*

Encontrarás más información en energycontrol.org

